



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ



Εθνικός
Οργανισμός
Παροχής
Υπηρεσιών
Υγείας
www.eopyy.gov.gr

Γενική Δ/νση: Οργάνωσης και Σχεδιασμού

Αγοράς Υπηρεσιών

Στρατηγικού Σχεδιασμού

Τμήμα : Τμήμα Σχεδιασμού Αγοράς & Παρακολούθησης

Δικτύου Παρόχων ΠΦΥ

Τμήμα : ΕΚΠΥ και Προγραμμάτων Πρόληψης & Προαγωγής
της Υγείας

Πληροφορίες: Π. Λυμπεροπούλου & Ε. Λαρεντζάκη

Ταχ. Δ/νση: Απ. Παύλου 12

ΤΚ 15123 Μαρούσι

Τηλ.: 2108110859

Email : d8.t1@eopyy.gov.gr

Μαρούσι, 18/10/2022

Αρ. Πρωτ.: ΔΒ3Α/Φ115/7/25061

ΠΑΝΕΛ. ΦΑΡΜΑΚ. ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚ.: 4497
ΗΜΕΡΟΜ.: 1.11.2022
Προς:

1. Προσωπικούς Ιατρούς
2. Συμβεβλημένους Ιατρούς ΕΟΠΥΥ
Ειδικοτήτων
3. ΠΕΔΙ ΕΟΠΥΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

- 1) Γραφ. Γενικού Διευθυντή Οργάνωσης
και Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών
- 2) Δ/νση Φαρμάκου
- 3) Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο
Πλουτάρχου 3 Αθήνα τ.κ. 10675
- 4) Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο
Πειραιώς 134 Ταύρος τ.κ. 11854

ΘΕΜΑ: "Αντιγριπικός εμβολιασμός "

Σας κοινοποιούμε την υπ' αριθ. πρωτ. Δ1α/Γ.Π. οικ. 55631/3-10-2022 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, σχετική με τον αντιγριπικό εμβολιασμό για την εποχική γρίπη ο οποίος, όταν εφαρμοστεί σωστά και έγκαιρα, προφυλάσσει από τη μετάδοση και συμβάλλει στην προστασία από τις σοβαρές επιπλοκές της γρίπης. Ο αντιγριπικός εμβολιασμός εφαρμόζεται στα άτομα (ενήλικες και παιδιά) που ανήκουν στις καλούμενες ομάδες υψηλού κινδύνου.

Στις ομάδες υψηλού κινδύνου ανήκουν :

1. Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω.
2. Παιδιά και ενήλικες που παρουσιάζουν έναν ή περισσότερους από τους παρακάτω επιβαρυντικούς παράγοντες ή χρόνια νοσήματα:
 - Άσθμα ή άλλες χρόνιες πνευμονοπάθειες.
 - Καρδιακή νόσο με σοβαρές αιμοδυναμικές διαταραχές.
 - Ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επίκτητη εξαιτίας νοσήματος ή θεραπείας).
 - Μεταμόσχευση οργάνων

- Δρεπανοκυτταρική νόσο (και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες).
 - Σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο χρόνιο μεταβολικό νόσημα.
 - χρόνια νεφροπάθεια.
 - Χρόνιες παθήσεις ήπατος
 - Νευρολογικά - Νευρομυϊκά νοσήματα
 - Σύνδρομο Down
3. Έγκυες γυναίκες ανεξάρτητα από την ηλικία κύησης, λεχωίδες και θηλάζουσες.
 4. Άτομα με νοσογόνο Παχυσαρκία και παιδιά με ΔΜΣ >95^η ΕΘ.
 5. Παιδιά που παίρνουν ασπιρίνη μακροχρόνια (π.χ. νόσος Kawasaki, ρευματοειδή αρθρίτιδα και άλλα).
 6. Άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με παιδιά <6 μηνών ή φροντίζουν ή διαβιούν με άτομα με υποκείμενο νόσημα, τα οποία διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών από τη γρίπη.
 7. Κλειστοί πληθυσμοί όπως προσωπικό και εσωτερικοί σπουδαστές (γυμνασίων-λυκείων, στρατιωτικών και αστυνομικών σχολών, ειδικών σχολείων ή σχολών), τρόφιμοι, νεοσύλλεκτοι, ιδρύματα χρονίως πασχόντων και μονάδες φιλοξενίας ηλικιωμένων
 8. Εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας (ιατρικό, νοσηλευτικό προσωπικό)
 9. Άστεγοι
 10. Κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι, χοιροτρόφοι, σφαγείς και γενικά άτομα που έρχονται σε συστηματική επαφή με πτηνά ή χοίρους.

Κρίνεται σκόπιμο η συνταγογράφηση να γίνεται με τη χρήση του κωδικού διάγνωσης κατά icd 10 - Z25.1 (ανάγκη ανοσοποίησης έναντι της γρίπης).

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου το αντιγριπικό εμβόλιο πρέπει να χορηγείται έγκαιρα και πριν την έναρξη της συνήθους περιόδου εμφάνισης της έξαρσης των κρουσμάτων γρίπης, δεδομένου ότι απαιτούνται περίπου 2 εβδομάδες για την επίτευξη ανοσολογικής απάντησης. Ο εμβολιασμός δύναται να συνεχίζεται καθ' όλη τη διάρκεια της εποχικής γρίπης για άτομα για τα οποία ενδείκνυται ο εμβολιασμός και δε πρόλαβαν να εμβολιαστούν εγκαίρως.

Ο εμβολιασμός γενικά περιλαμβάνει 1 μόνο δόση του εμβολίου ετησίως.

Το αντιγριπικό εμβόλιο μπορεί να χορηγηθεί ακόμη και την ίδια ημέρα με το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού –αλλά σε διαφορετικά ανατομικά σημεία- όπως και οποιαδήποτε άλλη μέρα πριν και μετά το εμβόλιο κατά του κορωνοϊού.

Επιπλέον, κρίνεται σκόπιμο να επισημανθούν οι χρονικοί περιορισμοί χορήγησης του αντιγριπικού εμβολίου σε σχέση με τη λοίμωξη covid 19 όπως αναφέρονται στην εγκύκλιο του Υ.Υ. .

Πιο συγκεκριμένα :

- Ασυμπτωματικοί ή προσυμπτωματικοί ασθενείς με θετικό εργαστηριακό έλεγχο covid 19 πρέπει να κάνουν το αντιγριπικό εμβόλιο μόλις ολοκληρώσουν την απομόνωσή τους.
- Ασυμπτωματικά άτομα που ήρθαν σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα covid 19 και έχουν αρνητικό εργαστηριακό έλεγχο μπορούν να εμβολιαστούν κανονικά.
- Συμπτωματικοί ασθενείς με λοίμωξη covid 19 πρέπει να αναβάλλουν τον εμβολιασμό τους μέχρι να ολοκληρωθεί η απομόνωσή τους και να υφεθεί η συμπτωματολογία της νόσου.

Παρακαλούμε για την εφαρμογή των αναφερομένων, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του Υ.Υ..



Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Θεόδωρος Β. Πασχάλης

