

Επικαιροποιημένο πρόγραμμα παιδικών εμβολιασμών - Οι δύο αλλαγές



[Διονυσία Προκόπη](#)

Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου 2025 14:00

Η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου, μίλησε σε ημερίδα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου για τα εμβόλια



Bigstock

Η Ελλάδα διαθέτει ένα από τα πιο σύγχρονα προγράμματα [εμβολιασμού](#), τόσο στα παιδιά όσο και στους ενήλικες. Το γεγονός αυτό αναδείχθηκε από όλους τους ομιλητές της [ημερίδας που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου.](#)

Η επίδραση του προγράμματος στη **δημόσια υγεία** είναι σημαντική, με οικονομικό και κοινωνικό όφελος, τόνισε η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, **Μαρία Θεοδωρίδου**. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε, από την εφαρμογή μόνο του παιδιατρικού προγράμματος εμβολιασμών δημιουργείται **εξοικονόμηση 213 εκατ. ευρώ στο σύστημα υγείας.**

Πριν από λίγες ημέρες, δημοσιεύθηκε το **επικαιροποιημένο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων 2025**. Σύμφωνα με την πρόεδρο της Επιτροπής, περιέχει εμβόλια για 20 παθογόνα και έχει **δύο νέα στοιχεία**: ένα ενδορινικό εμβόλιο κατά της γρίπης για παιδιά 2-5 ετών, και ένα μονοκλωνικό αντίσωμα κατά του RSV που προσφέρει παθητική ανοσοποίηση, δηλαδή βραχύβια προστασία για 7-8 μήνες. Εμβόλιο κατά του RSV για παιδιά δεν υπάρχει, σημείωσε, ενώ το εμβόλιο των ενηλίκων συστήνεται σε άτομα άνω των 75 ετών και σε όσα έχουν ναν υποκείμενο παράγοντα, από τα 60 και πάνω.

Πίνακας 1. Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων, 2025

Εμβόλιο ▼	Ηλικία* ► Γέννηση/ Μαιευτ.	1 μηνός	2 μηνών	3 μηνών	4 μηνών	5 μηνών	6 μηνών	10 μηνών	12 μηνών	15 μηνών	18 μηνών	19-23 μηνών	24-35 μηνών	36-47 μηνών	4-6 ετών	7-8 ετών	9-10 ετών	11-12 ετών	13-14 ετών	15-18 ετών
Φυματίωσης (BCG) ¹		BCG	BCG εφόσον δεν έχει γίνει προηγουμένως																	
Ηπατίτιδας Β (HepB) ²	• Έναρξη στη γέννηση • Όχι έναρξη στη γέννηση	HepB	HepB	HepB	HepB	HepB	HepB, 3 ή 4 ² δόσεις συνολικά						HepB							
Διφθερίτιδας, Τετάνου, Κοκκύτη ακυτταρικό (<7ετ.DTaP, ≥7ετ.Tdap) ³			HepB	HepB	HepB	HepB	HepB, 3 δόσεις συνολικά						HepB							
Πολιομυελίτιδας αδρανοποιημένα (IPV) ⁴			DTaP	DTaP	DTaP	DTaP	DTaP		DTaP		DTaP		DTaP		DTaP		Tdap ή Tdap-IPV	Tdap ή Tdap-IPV		Tdap ή Tdap-IPV
Αιμόφιλου ινφλουέντζας τύπου b (Hib) ⁵			IPV	IPV	IPV	IPV	IPV					IPV		IPV						
Πνευμονόκοκκου συζευγμένο (PCV20 ή εναλλακτικά PCV15) ⁶⁻⁷			Hib	Hib	Hib	Hib			Hib		Hib				Hib					
Μηνιγγιτιδόκοκκου οροσμάδας C συζευγμένο (MCC) ⁸			PCV	PCV	PCV	PCV		PCV		PCV		PCV						PCV20		
Μηνιγγιτιδόκοκκου οροσμάδων A,C,W135,Y συζευγμένο (MCV4) ⁹																		MCV4		MCV4
Μηνιγγιτιδόκοκκου οροσμάδας B πρωτεϊνικό (MenB-4C ή MenB-Hbp) ¹⁰			MenB-4C	MenB-4C	MenB-4C	MenB-4C		MenB-4C		MenB-4C		MenB-4C								
Ρότα ιού (RV1 ή RV5) ¹¹			RV1 ή RV5	RV1 ή RV5	RV1 ή RV5	RV1 ή RV5		RV5												
Ιλαράς, Παρωτίτιδας, Ερυθράς (MMR) ¹²									MMR		MMR		MMR					MMR		
Ανεμευλογιάς (VAR) ¹³									VAR		VAR		VAR					VAR		
Ηπατίτιδας Α (HepA) ¹⁴														HepA 2 δόσεις				HepA		
Ιού ανθρώπινων θηλυμάτων (HPV) ¹⁵																		HPV 2 δόσεις		HPV
Γρίπης (Infl) ¹⁶									Infl (ετησίως)							Infl (ετησίως)				
Κορωνοϊού (COVID-19) ¹⁷									Επικαιροποιημένο εμβόλιο για COVID-19											
Μονοκλωνικό αντίσωμα έναντι του RSV (mAbesyl, Nirsevimab) ¹⁸	mAbesyl, 1 δόση (στην αση ή της προηγούμενης BSV - Νουβισβόλ)	mAbesyl, 1 δόση (στην αση ή της προηγούμενης BSV - Νουβισβόλ)						mAbesyl, 1 δόση (στην αση ή της προηγούμενης BSV - Νουβισβόλ)												

* Ηλικία σε συμπληρωμένους μήνες ή έτη (π.χ. "6 μηνών"=6,0 έως και 1 ημέρα πριν 7,0 μηνών).
 ■ Συστήνεται για άτομα της ανάλογης ηλικίας που δεν έχουν ένδειξη ανοσίας.
 ■ Συστήνεται για άτομα σε ομάδες αυξημένου κινδύνου (βλ. Ομάδες αυξημένου κινδύνου).
 ■ Συστήνεται για νεογνίτητα υψηλού κινδύνου αμέσως μετά τη γέννηση (βλ. Επεξηγήσεις).
 ■ Συστήνεται χορήγηση πριν την έξοδο από το Μαιευτήριο στα νεογνίτητα που γεννήθηκαν την περίοδο του RSV εάν η μητέρα δεν εμβολιάστηκε για RSV στην κύηση (βλ. Επεξηγήσεις).

Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών

5

Photo 1/2

Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και Εφήβων 2025

Πηγή: Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών

Ειδικά για τη **γρίπη** διευκρίνισε ότι το κλασικό αντιγριπτικό εμβόλιο συστήνεται σε όλα τα βρέφη και παιδιά ηλικίας 6 μηνών έως 5 ετών και σε παιδιά και εφήβους ηλικίας 5 ετών και άνω που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου. Το νέο εμβόλιο με ζώντες εξασθενημένους ιούς το οποίο χορηγείται ενδορινικά, έχει τους εξής περιορισμούς:

Λόγω των εξασθενημένων ιών που περιέχει η χορήγησή του αντενδείκνυται σε παιδιά που έχουν εμφανίσει υποτροπιάζοντα επεισόδια συριγμού τους τελευταίους 12 μήνες ή ιστορικό βρογχικού άσθματος, σε εκείνα με ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επίκτητη) ή σε παιδιά που λαμβάνουν μακροχρόνια αγωγή με ασπιρίνη. Επίσης, σε παιδιά 2 έως 5 ετών που διαβιούν με άτομα με σοβαρή ανοσοκαταστολή συνιστάται ο εμβολιασμός με το παλιό αδρανοποιημένο αντιγριπτικό εμβόλιο.