

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ- ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥΣ

Στήλη1	Τιρζεπατίδη (Mounjaro®)	Σεμαγλουτίδη (Wegovy®)	Λιραγλουτίδη (Saxenda®)	Ναλτρεξόνη /Βουπροπιόνη (Mysimba®)	Ορλιστάτη (Xenical®)
Τρόπος χορήγησης	Υποδόρια ένεση	Υποδόρια ένεση	Υποδόρια ένεση	Από του στόματος	Από του στόματος
Δόση/συχνότητα	5-15mg εβδομαδιαίως	2,4 mg εβδομαδιαίως	3,0 mg ημερησίως	16/180 mg BID	120 mg TID
Πρόγραμμα τιτλοποίησης δόσης	2.5mg εβδομαδιαίως x για 4 εβδομάδες,στη συνέχεια 5mg εβδομαδιαίως Εάν ενδείκνυται αύξηση μετά από 4 εβδομάδες με 5 mg , τότε 7.5mg εβδομαδιαίως x για 4 εβδομάδες, στη συνέχεια 10mg εβδομαδιαίως, Εάν ενδείκνυται αύξηση μετά από 4 εβδομάδες με 10 mg τότε 12.5mg εβδομαδιαίως x για 4 εβδομάδες, στη συνέχεια 15mg εβδομαδιαίως	0.25mg εβδομαδιαίως x για 4 εβδομάδες, στη συνέχεια 0.5mg εβδομαδιαίως x για 4 εβδομάδες, στη συνέχεια 1mg εβδομαδιαίως x για 4 εβδομάδες,ακολουθως 1.7mg εβδομαδιαίως x για 4 εβδομάδες, στη συνέχεια 2.4mg εβδομαδιαίως	0.6mg ημερησίως x 1 εβδομάδα, στη συνέχεια 1.2mg ημερησίως x 1 εβδομάδα, στη συνέχεια 1.8mg ημερησίως x 1 εβδομάδα, στη συνέχεια 2.4mg ημερησίως x 1 εβδομάδα, στη συνέχεια 3.0mg ημερησίως	1 δισκίο ημερησίως x 1 εβδομάδα στη συνέχεια 1 δισκίο δις ημερησίως x 1 εβδομάδα, στη συνέχεια 2 χάπια το πρωί, 1 tablet το βράδυ x 1 εβδομάδα , στη συνέχεια 2 χάπια πρωί και 2 το βράδυ	Δεν απαιτείται
Κόστος	€€€€	€€€€	€€€€	€€€	€
Αντενδείξεις	• Προσωπικό ή οικογενειακό ιστορικό μυελοειδούς καρκίνου του θυρεοειδούς • Ατομικό ιστορικό συνδρόμου MEN2 • Εγκυμοσύνη, προσπάθεια σύλληψης, θηλασμός	• Προσωπικό ή οικογενειακό ιστορικό μυελοειδούς καρκίνου του θυρεοειδούς • Ατομικό ιστορικό συνδρόμου MEN2 • Εγκυμοσύνη, προσπάθεια σύλληψης, θηλασμός	• Προσωπικό ή οικογενειακό ιστορικό μυελοειδούς καρκίνου του θυρεοειδούς • Ατομικό ιστορικό συνδρόμου MEN2 • Εγκυμοσύνη, προσπάθεια σύλληψης, θηλασμός	• Μη ελεγχόμενη υπέρταση • Χρήση οπιοειδών (ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΗ) • Ιστορικό ή παράγοντες κινδύνου για επιληπτικές κρίσεις • Απώσιμη διακοπή του αλκοόλ • Ταυτόχρονη χορήγηση αναστολέων ΜΑΟ • Σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία • Τελικού σταδίου νεφρική ανεπάρκεια • Εγκυμοσύνη, προσπάθεια σύλληψης, θηλασμός	• Χολόσταση • Σύνδρομο χρόνιας δυσαπορρόφησης • Εγκυμοσύνη, προσπάθεια σύλληψης, θηλασμός
Συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες	Ναυτία, διάρροια, κοιλιακό άλγος, δυσκοιλιότητα, έμετος, υπογλυκαιμία σε συγχρήγηση με εκκριταγωγά ή ινσουλίνη	Ναυτία, διάρροια, δυσκοιλιότητα, έμετος	Ναυτία, δυσκοιλιότητα, διάρροια, έμετος	Ναυτία, δυσκοιλιότητα, πονοκέφαλος, ξηροστομία, ζάλη, διάρροια	Μαλακά λιπαρά κόπρανα, τεινεσμός, διάρροια
Σπάνιες ανεπιθύμητες ενέργειες	Χολολιθίαση, γαστροπάρεση, παγκρεατίτιδα	•Χολολιθίαση •Παγκρεατίτιδα	•Χολολιθίαση • Παγκρεατίτιδα	•Επιληπτικές κρίσεις • Επιδείνωση της κατάθλιψης	• Ηπατική ανεπάρκεια • Νεφρολιθίαση • Οξεία νεφρική βλάβη
Φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις	Μπορεί να επηρεάσει την απορρόφηση των φαρμάκων λόγω της επιβράδυνσης της γαστρικής κένωσης, αντισυλληπτικά, παρακεταμόλη	Μπορεί να επηρεάσει την απορρόφηση των φαρμάκων λόγω της επιβράδυνσης της γαστρικής κένωσης	Μπορεί να επηρεάσει την απορρόφηση των φαρμάκων λόγω της επιβράδυνσης της γαστρικής κένωσης	Τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, αναστολείς επαναπρόσληψης σεροτονίνης, Β- blockers, αντιψυχωσικά, αντιαρρυθμικά, ντοπαμινεργικά , κλοπιδογρέλη, καρβαμαζεπίνη, φουμαρικό οξύ, φουμαρικό οξύ	• Αυτοδιαλυτές βιταμίνες • Λεβοθυροξίνη • Κυκλοσπορίνη • Από του στόματος αντισυλληπτικά • Διουρητικά